

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018

RGT SACRAMENTO



Representante: MAS Seeds

Año de registro: 2014 (Reino Unido)

Protección: COMUNITARIA

Espiga: Aristada

Altura de la planta: MEDIA (- 3 cm/BOTTICELLI; + 9 cm/CAMARGO; + 6 cm/CHAMBO; + 4 cm/MARCOPOLO; - 2 cm/NOGAL)

Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2015-16	2016-17	2017-18	
RGT SACRAMENTO	126,7	110,7	108,8	115,4
BOTTICELLI (Testigo)	110,4	102,9	101,4	104,9
CAMARGO		102,9	105,7	
CHAMBO		104,0	102,9	
MARCOPOLO		111,2	107,1	
NOGAL (Testigo)	89,6	97,1	98,6	95,1
Índice 100 (kg/ha)	6664	4819	6296	5926
Número de ensayos	11	19	18	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
	RGT SACRAMENTO	112,0
BOTTICELLI (Testigo)	100,9	102,6
CAMARGO	108,2	100,6
CHAMBO	107,0	99,7
MARCOPOLO	110,1	108,3
NOGAL (Testigo)	99,1	97,4
Índice 100 (kg/ha)	5077	6341
Número de ensayos	19	16

CICLO

Tipo: INVIERNO

Fecha de espigado: TARDÍA (+ 9 días/BOTTICELLI; + 7 días/CAMARGO; + 5 días/CHAMBO; + 2 días/MARCOPOLO; + 8 días/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: MEDIA A ALTA

Oídio (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*): MEDIA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA

Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): MEDIA


Roya parda (*Puccinia triticina*): MEDIA A ALTA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: MEDIO (- 3,8 kg/hl/BOTTICELLI; - 0,1 kg/hl/CAMARGO; + 1,9 kg/hl/CHAMBO; + 0,5 kg/hl/MARCOPOLO; - 1,4 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: MEDIO (- 7,4 g/BOTTICELLI; - 0,5 g/CAMARGO; - 0,3 g/CHAMBO; - 1,6 g/MARCOPOLO; + 2,4 g/NOGAL)

Contenido en proteína: BAJO A MEDIO (0 %/BOTTICELLI; - 0,3 %/CAMARGO; - 0,4 %/CHAMBO; - 1,0 %/MARCOPOLO; - 0,7 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 5 (W:150; P/L:1,6)